

Paciente de 30 años con síndrome de preexcitación intermitente

Dr. Oswald Londono

Me gustaria tener la opinión de estos electros y holter. Se trata de paciente de 30 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, trabaja en MERCABARNA (mercado de alimentos), en una pescadería. Refiere palpitaciones desde hace dos meses. Vienen espontáneamente y así se marchan, sin ninguna sintomática.



Le realizo el Holter y una prueba de esfuerzo. Posteriormente repito el ecg. Los electrocardiogramas realizados en diversas ocasiones los han interpretado como normales, según palabras de la paciente.


Espero vuestros comentarios.

Saludos, Oswald Londono



2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026





Centre Mèdic i Cardiològic Dr. Londono
Av. Roma 148-150 Entresòl 1ª

Nº del examen
106-00376

Paciente: desconegut2 desconegut2
Fecha del examen: 31/01/2013 19:52:56

Código
106-00366





Centre Mèdic i Cardiològic Dr. Londono
 Av. Roma 148-150 Entresòl 1ª

Nº del examen
106-00379

Paciente: desconegut desconegut
 Fecha del examen: 06/02/2013 19:53:28

Código
106-00369



Centre Mèdic i Cardiològic Dr. Londono
Av. Roma 148-150 Entresòl 1ª

Nº del examen
106-00379

Paciente: desconegut desconegut
Fecha del examen: 06/02/2013 19:53:28

Código
106-00369

7) 96 bpm - Depresión del ST (2.3 mm no C3) - (103 bpm)



8) 94 bpm - Depresión del ST (4.8 mm no C2) - (95 bpm)



OPINIONES DE COLEGAS

Hola Oswald

Me parece que tu paciente tiene una preexcitación intermitente.
Si tiene palpitaciones, hazle un EPS seguido de ablación y se soluciona el tema.

Adrián Baranchuk

Gracias Adrián, agradezco tu comentario. La paciente se encuentra bien y cuando le comenté de esta posibilidad lo rechazó, pero intentaré de nuevo recomendarle el EEF + ablación, por ahora se puede hacer en nuestros hospitales públicos.

Saludos. Oswald

Si no lo acepta, tal vez acepte una Prueba de Esfuerzo. Si bien la preexcitación es intermitente (lo que sugiere bajo riesgo) la paciente está sintomática y tal vez quiera curarse. La prueba de esfuerzo sería útil como marcador no invasivo del período refractario anterógrado del haz.

Salud
Adrián Baranchuk

Adrián, uno de los trazados es finalizando la prueba de esfuerzo, ahí es cuando se ha manifestado el WPW con QRS ancho.

Saludos, Oswald

Tengo la misma opinión que Adrián Baranchuk: WPW intermitente
Saludos al FORO
Carlos Lavergne. Neuquen Patagonia Argentina
