

Adolescente de 13 años con aleteo auricular – 2003

Dr. Diego Esandi

Estimados amigos:

consulta por una adolescente de 13 años que habiendo presentado algunos muy breves y no documentados episodios de taquicardia paroxística, hace unos días presenta una Taquicardia paroxística supraventricular con una FC de 280 aproximadamente con QRS angosto y ondas P no identificables. Cede con maniobras vagales y queda con un aleteo auricular con conducción desde 8:1 a 3:1. Se realiza cardioversión con buena respuesta, una vez descartados coágulos auriculares por eco, cediendo al tercer intento con 120 joules.

Inicia tratamiento con digoxina, no teniendo en el ECG patrón de WPW.

Se investiga hipertiroidismo. Es de destacar que la paciente presentó a los 5 años de edad, pubertad precoz que se trató con buenos resultados. Sin medicación desde los 9 años de edad.

Lo llamativo es el aleteo, de salida de su TPSV, en una adolescente con corazón "sano". Cualquier comentario sera bienvenido.

Atte

Dr. Diego Esandi

OPINIONES DE COLEGAS

Dr. Diego Esandi

Estimado colega:

Una vía accesorio oculta puede explicar la tachycardia de 280 latidos por minuto y el aleteo auricular aún en presencia de corazón normal.

Fibrilación y aleteo auricular son más frecuentes en presencia de vías accesorias y generalmente desaparecen luego de la ablación. Mi pregunta es ¿por qué digoxina si la frecuencia durante el aleteo no era rápida?

Lo saludo cordialmente,

Mario D. Gonzalez
