

Serie de pacientes con enfermedad de Chagas tratados con benznidazol. Caso 4

Dr. Daniel Oscar Mordini

EB

Paciente con serología reactiva para Enfermedad de Chagas.

Fue tratado con benznidazol según esquema habitual en el año 2003 a los 13 años de edad, en el Hospital de Cruz del Eje.

Vive en Zona rural del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, Argentina.

Antecedente de madre portadora de Enfermedad de Chagas.

El ECG en ese entonces era normal.

Viene a la consulta en 2017 para que se le otorgue Apto físico para jugar al fútbol en equipo de su pueblo.

Es asintomático y no volvió a la consulta a pesar que fue reiteradamente convocado dado los hallazgos de los estudios.

Se niega a dejar la práctica deportiva.

Se negó a implante de MCPD.

ERGOMETRÍA

FCMP: 195 LPM 85% FCMP: 166 LPM % de FCMP alcanzado: 85 [%]
Minutos ejercitados: 13:32 [min] Consumo O2: 30299.00 [ml]
Test detenido por: Fin del Protocolo
Prob. Pre-Test: 3.00 [%] Prob. Post-Test: 6.00 [%]

	Tiempo	Esfuerzo	METS	FC	PA	ITF	VO2	ST	Angina
	[min]	[% Grad]/[Km/Hora]		[LPM]	[mmHg]	[LPM]/[mmHg]	[ml/min]		
Basal	01:00	Basal	1.0	45	100/80	4500	227.50	No	No
Etapa 1	03:02	10.0 / 2.70	4.7	77	110/80	8470	1089.25	No	No
Etapa 2	05:03	12.0 / 4.50	7.6	93	110/80	10230	1729.00	No	No
Etapa 3	03:01	14.0 / 6.00	10.3	109	120/80	13080	2343.25	No	No
Etapa 4	03:02	16.0 / 6.80	12.1	135	130/80	17550	2752.75	No	No
Etapa 5	01:24	18.0 / 8.00	14.8	171	130/80	22230	3364.83	No	No
Recuperación	04:03	Recuperación	1.5	38	100/80	3800	227.50	No	No

Conclusiones:
PEG SUFICIENTE SUBMAXIMA NEGATIVA CLINICA Y ECG PARA ISQUEMIA DE MIOCARDIO.
DETENIDA POR FATIGA EN LA ETAPA 5/10 POR FATIGA GENERALIZADA.
ALCANZO EL 85% FCMT (171 lpm) - 15 METS
CURVA TENSIONAL NORMAL.
CURVA CRONOTROPICA: INICIA LA PRUEBA CON FC BASAL DE 45 LPM, DE DIFICIL ASCENSO Y DISCORDANTE CON EL ESFUERZO REALIZADO. AL ALCANZAR EL 85% A MAXIMO ESFUERZO EL PACIENTE ALTERNA PERIODOS DE BRADICARDIA SINUSAL, ANTES DE COMENZAR RECUPERACION PRESENTA CAIDA BRUSCA DE LA FC, NO SE EVIDENCIA ONDA P (B A-V COMPLETO?) CON CAIDA DE TENSION ARTERIAL, INESTABILIDAD POSTURAL Y MALESTAR GENERAL, POR LO QUE SE DETIENE LA PRUEBA.
NO PRESENTO ARRITMIAS

HOLTER

Pausa 2.7sg - 25 mm/seg, 10 mm/mV



Pausa 2.4sg - 25 mm/seg, 10 mm/mV



Pausa 2.1sg - 25 mm/seg, 10 mm/mV

