

# Paciente masculino de 15 años con palpitaciones – 2014

Dr. Juan José Sirena

Estimados amigos foristas

Envío caso de masculino de 15 años con antecedentes de palpitaciones, no síncope.

Holter sin evidencias de taquiarritmias.

Eco sin evidencias de alteraciones estructurales.

Trae certificados médicos de no es deportivas ni laborales.


Diagnóstico

localización

conductas

En espera de sus valiosas opiniones, saludos cordiales

Juan José Sirena



## OPINIONES DE COLEGAS

Hola Dr. Sirena: ¿laborales? ¿será acaso piloto de aviones el paciente?

Localización de vía accesoria: pósteroseptal derecha

Un cordial saludo

Martín Ibarrola

---

WPW - Localización lateral izquierda. Tratamiento: ablación.

Saludos

Luis Aguinaga

---

Al foro,

1. Preexcitación ventricular (WPW)
2. Vía lateral/ánterolateral izquierda
3. Documentar si las palpitaciones se correlacionan con TSV.
4. Si las palpitaciones no se correlacionan con TSV es un WPW asintomático. Si no es deportista competitivo o trabajo de riesgo: seguimiento.
5. Si hay correlación, es un síndrome de WPW y la ablación es el tratamiento.

Saludos.

Oscar Pellizzon.

---

Estimado Sirena:

el ECG muestra preexcitación ventricular por una vía accesoria izquierda lateral. Parece que el muchacho es bien longilíneo y es por eso que las ondas P son negativas en V1 y V2 (o los electrodos están colocados algo por encima del nivel convencional). En algunas derivaciones parece observarse el comienzo de la repolarización auricular. Sugiero realizar una prueba de esfuerzo para valorar el riesgo potencial de la vía de acuerdo con el comportamiento de la conducción ante el aumento de la frecuencia. Si la preexcitación persiste durante la FCMx, sería entonces proclive a realizar una exploración EFL y eventual ablación de la vía.

Un abrazo

Pablo A Chiale