

# Evento embólico en paciente anticoagulado - 2020

Dra. Dariana Viegas Andrade Penteado

Tengo un paciente que tuvo un evento embólico usando NOAC (Rivaroxabana) y Apixabana, siendo este último el evento que ocurrió dentro de las 24 horas de uso. ¿Qué hacer?

¿Cambiar por Marevam (warfarina)? ¿Oclusión del apéndice auricular?

Dariana Viegas Andrade Penteado

---

## OPINIONES DE COLEGAS

Querida Dariana

Con los escasos datos que aportas no creo que en un paciente con un TEP sea de mucha ayuda rotar de NOAC a warfarina

Esta lista no es el vehículo más adecuado para resolver lo que pareciera ser una urgencia; no obstante sería muy bueno si pudieras enviar más datos clínicos para intentar diseñar una estrategia

Afectuosamente

Edgardo Schapachnik

Estimada Dariana: A pesar del buen progreso en el manejo del paciente con FA, esta arritmia sigue siendo una de las principales causas de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, SD y morbilidad. Claramente, su paciente está en FA, por lo tanto, la respuesta a su pregunta está dentro de este enlace (full text)

<https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/38/2893/2334964>

Andrés R. Pérez Riera

---

Hello Dariana

Pharmacological options Warfarina or Dabigatran

Thinking about occlusion of atrial appendage

Juan Muntaner