

Enfermedad de Chagas en la República Oriental del Uruguay - 2017

Dr. Andrés R. Pérez Riera

Según Salvatella (1) la situación actual de Uruguay, en referencia a la enfermedad de Chagas se resume así: la transmisión vectorial domiciliaria fue interrumpida desde 1997, con recertificación vigente; la eliminación de *Triatoma infestans* (vinchuca domiciliaria) como problema de salud pública ha ocurrido desde 2013; se hacen verificaciones en las donaciones de sangre en todo el País desde 1985. La única vía de transmisión posible, es la congénita de gestante infectada por *T.cruzi* portadora de infección crónica, por vía transplacentaria al feto, que se registra en el 2 al 8 % de los embarazos de madre infectada por *T.cruzi*. (En Uruguay se registrarían anualmente entre 20 y 40 casos anuales congénitos (2). Existen actualmente aproximadamente 9 mil personas en la fase crónica de la enfermedad, con una amplia mayoría de individuos asintomáticos; y el 20 a 30% de ellos, desarrollarán formas cardíacas o digestivas de la afección crónica. Con formas cardíacas crónicas se calcula que existan 3000 personas en todo el Uruguay. (El País tiene 3.500.000 habitantes)

1. Roberto Salvatella¹ Chagas in Uruguay, 1937-2016. Basic information for prevention, control and care Arch. Pediatr. Urug. vol.87 no.1 Montevideo mar. 2016
2. Organización Panamericana de la Salud. Consulta OPS sobre enfermedad de Chagas congénita, su epidemiología y manejo. (Montevideo, Uruguay, 24-25 junio 2004). Washington, DC: OPS, 2004.