

Interações medicamentosas do verapámil - 2010

Dr. Andrés R. Pérez Riera

Bloqueantes b-adrenérgicos: não é aconselhável a associação pela potencialidade de desencadear hipotensão, bloqueio A-V, colapso, insuficiência cardíaca e até assitolia pelo efeito aditivo da inibição da contractilidade miocárdica e o dromotropismo negativo na junção. Caso se associem deve monitorar-se o ECG, FC e PA.

Digoxina: o verapamil pode elevar em **30%** os níveis da digoxina por diminuir seu clearance. Nunca deve usar-se na presença de intoxicação digitalica!! pelo potencial de bloqueio atrioventricular letal.

Quinidina: a associação de ambas drogas pode ocasionar hipotensão.

Ciclosporina: o verapamil aumenta o nível sérico desta droga podendo surgir nefrotoxicidade e ototoxicidade pelo acúmulo.

Carbamazapina: o verapamil diminui o clearance da droga podendo surgir nefrotoxicidade e ototoxicidade pelo acúmulo.

Lítio: o verapamil aumenta o clearance desta droga.

Rifampicina: aumenta o clearance do verapamil.

Bloqueantes neuromusculares: são potencializados pelo verapamil.

Anestésicos inalatórios: ídem podendo potencializar o inotropismo, dromotropismo e automatismo negativos.