

Múltiples denominaciones del síndrome de Tako Tsubo - 2018

Dr. Andrés R. Pérez Riera

Me suena extraña la denominación “corazon roto”. Pensé que en español se usaba “corazón partido” como en la música de Alejandro Sanz <https://www.youtube.com/watch?v=YSpRcpwGxM8>

Curiosamente esta es la entidad que sea de mi conocimiento con mayor número de denominaciones:

- I. Broken heart syndrome;
- II. Apical ballooning;
- III. Apical ballooning syndrome (abs);
- IV. Ballooning cardiomyopathy;
- V. Transient LV apical ballooning
- VI. Left ventricular apical ballooning syndrome
- VII. Transient left ventricular apical ballooning syndrome
- VIII. Transient antero-apical dyskinesia
- IX. Transient apical dyskinesia syndrome
- X. Takotsubo syndrome
- XI. Takotsubo cardiomyopathy
- XII. Stress cardiomyopathy
- XIII. Stress-induced cardiomyopathy
- XIV. DISEASEDB33976; and
- XV. D054549

Hay una notable revisión de 2015 imperdible conducida por Pelliccia con una data base de mas de 1000 pacientes

Pelliccia F, Parodi G, Greco C, Antonucci D, Brenner R, Bossone E, Cacciotti L, Capucci A, Citro R, Delmas C, Guerra F, Ionescu CN, Lairez O, Larrauri-Reyes M, Lee PH, Mansencal N, Marazzi G,

Mihos CG, Morel O, Nef HM, Nunez Gil IJ, Passaseo I, Pineda AM, Rosano G, Santana O, Schneck F, Song BG, Song JK, Teh AW, Ungprasert P, Valbusa A, Wahl A, Yoshida T, Gaudio C, Kaski JC. Comorbidities frequency in Takotsubo syndrome: an international collaborative systematic review including 1109 patients. *Am J Med.* 2015 Jun;128(6):654.e11-9. doi: 10.1016/j.amjmed.2015.01.016