

Paciente de 42 años con antecedentes de MS familiar – 2010

Dr. Andrés R. Pérez Riera

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, pardo, 42 anos, casado, evangélico, primeiro grau incompleto, natural de uma zona rural pobre do interior de Minas Gerais (vilarejo próximo da cidade de Montes Claros) nas margens do rio São Francisco. Brasil.

Trabalhador rural até os 20 anos de idade quando ocorrera sua migração para Santo André (grande São Paulo) em procura de melhores oportunidades. Desempenha-se como trabalhador braçal (ajudante de pedreiro na construção civil) desde essa data.

Refere que na sua terra natal morou em casa de “pau a pique”, sem água encanada (água de poço) nem luz elétrica e que frequentemente passava “o pessoal do governo”, “da Sucan” limpando as moradias.

Pai falecido de morte súbita com 38 anos. Quinto irmão de uma prole de 10. Dois falecidos repentinamente com 37 e 40 anos de causa desconhecida.

Refere que desde há aproximadamente um ano, vem sentindo fraqueza progressiva, fadiga crônica, inchaço abdominal, de membros inferiores e necessidade de urinar várias vezes durante a noite.

Vários episódios de tontura, palpitações e de desmaio com perda fugaz da consciência há três meses. Novos desmaios em duas ocasiões nas duas últimas semanas durante as tarefas habituais.


Exame físico: ingurgitamento das veias jugulares ++, edema ++ de membros inferiores nos tornozelos, abdome distendido, ictus no 6to EIE na linha axilar anterior, terceira bula com cadencia de galope e SS++ em foco mitral regurgitante irradiado a axila esquerda.

Pulmões livres e murmúrio vesicular presente.

Fígado doloroso palpável a 5 cm da borda costal direita.

FC 57bpm, pulsos periféricos alternantes e presentes. PA 100/60mm de Hg.

Name: JAF **Gender:** Male **Ethnic group:** mixed: **High:**1.67m **Weigh:** 64Kg
Date: January 10/2009 **Time:** 16:40PM **Medication in use:** Initiation with
amiodarone 400mg , carvedilol 3,125 2 x + enalapril 10mg 2x+ espironolactone
25mg + AAS 1




EXTERNAL ECG FROM EMERGENCY ROOM OF ANOTHER HOSPITAL


Name: JAF Gender: Male Ethnic group: mixed ; High:1.67m Weigh: 64Kg
Date: January 05/2009 Time: 23:25PM




DI




DII



DIII



aVR




aVL



aVF



V1




V2




V3



V4




V5



V6

This ECG belong to an asymptomatic younger (29 years old) brother who was accompanying our patient.
We performed this ECG only by curiosity by the dark familiar background antecedent.

Este ECG pertence a seu jovem irmão (29 anos) assintomático que acompanhava nosso paciente.
Nós fizemos este traçado apenas por curiosidade por seus antecedentes familiares sombrios.



OPINIONES DE COLEGAS

Querido Andrés, complicado el tema:

1- datos a destacar a mi entender, MS familiar, historia sincopal del paciente asociado a una historia de insuficiencia cardiaca a predominio derecho (edemas, ingurgitación yugular, hepatomegalia, etc)

2- el primer ECG presenta una bradicardia sinusal, BAV 1°, HBAI y BRD, así parece fácil, y deberíamos pensar en primer lugar en una cardiopatía chagásica, los síntomas de IC se

podrían explicar por la cardiopatía en sí y probablemente la bradicardia empeore o colabore en empeorar los síntomas del paciente

3- pero por otro lado este primer ECG muestra hallazgos sugestivos de patrón eléctrico de Brugada, especialmente en V2 y V3, sumado a la prolongación del PR, el eje a la izquierda (hallazgos también en el Brugada) no tiene R mayor de 3 mm, y el Qtc me parece dentro de lo normal (me dio 430 ms en V5)

4- el segundo ECG es difícil a mi entender, en DI y DII taquicardia con QRS ancho, pareciera que luego cambia a una FA, no veo onda P, es irregular, con algunos latidos mas anchos (¿aschmann?, no creo), pero podría haber ingresado con un flutter que se transformó en FA, tampoco puedo descartar que sea TV, pero me inclino más a algo supraventricular

5- y del último ECG del hermano, lo que me llama la atención de todo a simple vista, no es un ECG fácil, como ninguno de los trazados raros que manda Andrés, es la onda P acuminada, tipo pulmonale.

¿Cómo encararlo para ser unicista?: ¿Síndrome de Muerte Súbita familiar? padre, tíos, todos con MS jóvenes, todos chagásicos, una posibilidad, el Chagas en Brasil afecta más el tracto digestivo que el cardiovascular (¿sigue siendo así?), ¿que tengan Chagas y además algunos la genética para Brugada? otra posibilidad, que tengan alguna vía accesoria sumado a todo esto, no sé

Lo dejaría internado sin dudas, monitorizado, ecocardiograma y test para Chagas lo primero y después seguimos y que Dios y Andrés me ayuden

Espero sus comentarios, Maestro,

Saludos

Francisco Femenia

Hola, el ECG tiene

- 1) BCRDHH + HBAI + BAV 1° grado (bloqueo trifascicular)
- 2) QT 0,44/46 ms para una FC de 57 x min.
- 3) Trastorno de repolarización ventricular cara inferior – ápex y ántero lateral.
- 4) Falta de progresión de R en V3 – 4 y 5.

Por los datos clínicos tiene una Insuficiencia cardiaca por miocardiopatía de posible etiología chagásica (es de América del sur) vs isquémica, que hizo una arritmia ventricular maligna (TV monomorfa con EV frecuentes, precoces, en duplas, monofocales). Es un paciente con riesgo de MS. hay que valorar el estado del miocardio y el estado electrofisiológico. La presencia de TV en los pacientes con miocardiopatía dilatada es un signo de mal pronóstico, más del 60 % fallecen en los próximos meses al episodio de TV. Y tras la valoración se verá el tratamiento que a prima facie es DAI.

Saludos.

Dr. Tomás Campillo.

Estimado Andres:

- 1) Realizar Serología para Chagas. Estoy casi seguro que es positiva
- 2) ICC descompensada por miocardiopatía dilatada.
- 3) ECG inicial RS.FC 55 x m. PR 0,20 seg.HAI + BCRD (típico de Chagas).
- 4) ECG emergencia: tiene algunas derivaciones con TVMS, resto de derivaciones son de mala calidad.
- 5) Realizar ECO 2D y evaluar FEy.
- 6) Si Fey es mayor de 40% amiodarona, si Fey es menor de 40% CDI (prevención secundaria).

Mi diagnóstico es miocardiopatía dilatada chagásica, ICC descompensada y TVMS sincopal.

ECG del hermano, también es el de un chagásico. Tiene necrosis ánterolateral aunque sin trastornos de conducción típicos, que también es frecuente ver. En este caso el tema merece más discusión, que la podemos hacer.

Abrazo.

Oscar Peñízzón.

Que lastima que no puedo abrir los ECGs, pero el email de Femenia me hizo matar de la risa: puede ser Brugada o Chagas o una via accesoria o...¿qué más Francisco?

Me haces acordar del chiste de los médicos que van a cazar patos, y el cirujano tira con perdigones a todo lo que vuela, con la intención de "cachar" algo!!!

Femenia, también podría ser Sme de QT corto, Andersen Tawil, arritmia sinusal respiratoria, Ebstein, Osborn, dale que me quede corto...JAJAJAJAJ

No te enojas Francisco, te lo dice un amigo que te quiere, y además acabo de terminar la ablación de la TV (isquémica/incesante), nos fue genial, estamos empezando la tercera ablación del día, feliz, entero...dejame que me ría un poco a tus expensas, ya te reirás vos de mi en el futuro...dale, Francisco!

Un abrazo. Andrés ¿me puedes mandar los ECG por correo privado a ver si los puedo ver?

Grazie

Adrián Baranchuk

A simple vista si, cChagas, uno para abrir la cabeza puede pensar en Brugada pero la verdad no me suena Brugada y síntomas de insuficiencia cardiaca. Otra patología desconocida por la asociación familiar?. LA REALIDAD ES LA EXTREMA POBREZA DE LATINOAMERICA y toda la familia debe haber tenido contacto con el Chagas y eso no me da diagnóstico de miocardiopatía chagásica (eso creo yo que tiene) Lástima que a los hermanos no se los ha estudiado con autopsia (hace mucho que no veo una de causas no legal).

Una cosa que me dejó picando el mail del Dr. Adrian Baranchuk. Muchas veces utilicé el "criterio unicista por único" pero al buscar en el diccionario de la Real Academia no me sale la palabra y hasta mis clases a los residentes sobre enfoque del problema del paciente tiene la palabra así que HELP. (tampoco me sale como unicista)

Simón Pero

Querido Oscar apenas para el conocimiento de todos ¿podrías explicar el fundamento de la conducta que externas decir el trial o los trials que apoyan tal proceder amiodarona versus CDI en base a la FE?

Gracias desde ya

Adriancinho: Esto se llama en medicina el viés de procedencia. Me dió la impresión que Femenia tuvo el viés de procedencia (para los que no saben viés (Bias) en epidemiología se denomina al error aleatorio, sistemático en general no afectado por el tamaño de la muestra).

Francisco pensó así: Los ECG vienen de Andrés. Entonces debe ser un Brugada. Este loco en el 90% de las cosas que escribe son relativas a Brugada syndrome.

Es como decía en mi último e-mail tiene cianosis un chico con cinco años tiene que ser tetralogía de Fallot.

Andrés R. Pérez Riera

Adrián:

¿Por qué no podés abrir el archivo?

Fijate bien que envié un segundo mail corrigiendo el link de acceso a la TERCERA BIBLIOTECA

El archivo se llama Sudden_death.pdf

En segundo lugar, no debieras reírte tanto.

Cuando entré a la residencia en 1969 (¿habías nacido vos?) el grupo de Rosenbaum (Elizari y Lazari) estaban con nosotros en el Hospital Argerich; el servicio entonces estaba a cargo de Fernando Battle, uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Cardiología y luego, en 1974 seguido por Carlos Bertolasi. Estuvieron poco tiempo hasta que Rosenbaum se hizo cargo del Pabellón Inchauspe en el Ramos Mejía, cuando ellos y otros que eran del Grupo inicial de Rosenbaum (que estaba a cargo del viejo -hoy inexistente- Hospital Salaberry) se fueron con él.

En esa época, ellos comenzaron a usar ajmalina en pacientes chagásicos con BIRD y observaban que se presentaba un fenómeno que hoy diríamos ¡es un Brugada!

Posiblemente Andrés pueda explicar este fenómeno mejor que yo, desde el punto de vista de los fenómenos de los canales que se pondrían en juego.

Yo solo lo cuento como anécdota de la residencia, porque seguramente hoy no le haríamos ajmalina en el consultorio externo a ningún paciente, aunque los autores lo consideraban un procedimiento sencillo y seguro y porque así conocen un poco la Historia de nuestra cardiología y me encanta compartirla.

Te adjunto un paper histórico

Am J Cardiol.1982 Jan;49(1):14-20.

Electrocardiographic changes evoked by ajmaline in chronic Chagas' disease with manifest myocarditis.

[Chiale PA](#), [Przybylski J](#), [Laiño RA](#), [Halpern MS](#), [Sánchez RA](#), [Gabrieli A](#), [Elizari MV](#), [Rosenbaum MB](#).

Conversion from Chagas' infection to chagasic myocarditis occurs slowly and the earliest signs of myocardial involvement are hard to define. To obtain new information on this difficult clinical problem, ajmaline was administered (1 mg/kg body weight intravenously) to 101 patients with Chagas' infection and to 46 patients without such infection (control group). In 3 patients in the control group left anterior hemiblock alone occurred whereas in the group with Chagas' infection, ajmaline caused the occurrence of right bundle branch block, left anterior hemiblock, or both, in 32 patients (31.6 percent), ventricular extrasystoles in 8 (7.9 percent) and ischemic ST-T changes in 7 (6.9 percent). Ajmaline

*may thus evoke the most typical electrocardiographic changes of chronic chagasic myocarditis in patients without signs of myocardial involvement or only minor nonspecific signs. A positive **ajmaline** test, defined in the present context as the occurrence of a fascicular block, ventricular arrhythmias or ischemic ST-T changes, may indicate the existence of localized areas of injured myocardial tissue, not enough to alter the electrocardiogram by itself, but able to give rise to severe abnormalities after exposure to the drug. The test may therefore be used as a nonspecific detector of myocardial damage, and thus may have a much broader scope of clinical application. In chronic **Chagas'** infection, the **ajmaline** test is a relatively simple and apparently safe procedure that may serve to unveil the earliest signs of chagasic myocarditis.*

PMID: 6172031 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Edgardo Schapachnik

Claro.

Vies de procedencia, aprendi algo Nuevo hoy. Gracias.

Y no se porque, pero Edgard hoy no tiene sentido del humor...

Estoy seguro que Femenia se rio con mi email.

Adrián Baranchuk

Obviamente me reí mucho, igual era un ejercicio diagnóstico, aún equivocado, y viniendo de Andrés, no porque sabe y escribe mucho sobre Brugada, sino por los ECGs extraños que suele mandar, pero igual era un ejercicio médico escrito en voz alta, pero la impresión inicial fue un chagásico, me dejó picando lo de Simon Pero, el termino unicista, uno lo hereda desde la residencia, sería tratar de unir todos los elementos para ver si llegamos a una sola entidad, en este caso un diagnóstico clínico que pueda abarcar todo o justificar lo que le pasa al paciente, pero siempre es multifactorial, substrato, desencadenantes y moduladores.

Saludos y sigan pegando no hay problema, igual me sumo al ser una M. chagásica, le indico de una un DAI y bicameral, y que siga la polémica,

Saludos

Francisco Femenia

Estimados amigos,

El ECG en ritmo sinusal de este paciente de 42 años apunta:

- Que el VD se expone fuertemente a las derivaciones precordiales con morfología rS hasta V5 + T negativa. Esto sugiere gran dilatación de esta cavidad.
- Anchura del QRS en V1>V6 (ver adjunto).
- Eje de P muy desviado a la izquierda (P en DI>DII).
- BAV 1er grado.
- Hemibloqueo anterior izquierdo.


El ECG en taquicardia, aunque parece que las distintas no derivaciones están registradas en el mismo momento, sugiere:

- *TV con eje inferior en el plano frontal. En precordiales es necesario poder ver los complejo ectópicos en el mismo momento en el tiempo en las diferentes derivaciones; así y todo pero parece que el origen es del VD.*

El ECG del hermano de 29 años:

- Presenta en eje QRS desviado a la derecha en plano frontal.
- Morfología rS en precordiales que sugiere también dilatación del VD.

En conclusión, en mi opinión aparte de descartar Chagas habría que pensar también endisplasia arritmogénica del VD como enfermedad familiar causante de muerte subita.



Un abrazo.

Javier García Niebla

Estimado Andrés.

El estudio más importante sobre prevención secundaria es el AVID (amio vs CDI) que incluyó pacientes con paro cardíaco o TV sintomática y FEy < 40%.. Por supuesto no había chagásicos. En esta situación nosotros extrapolamos. Cuando se hicieron subanálisis se observó que aquellos que presentaban una Fey > 35% no eran de tan alto riesgo y el CDI no otorgaba gran beneficio con respecto a la amio. Como en Chagas no

existe tal evidencia nosotros consideramos que la amio ocupa un lugar en aquellos que tienen 35-40% de Fey y TVMS.

La bibliografía que avala estos datos son las siguientes.

STATE-OF-THE-ART PAPERS. Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy in Clinical Practice

David A. Cesario, MD, PHD,* G. William Dec, MD† J Am Coll Cardiol 2006;47:1507–17.

The greatest benefit of ICD therapy in all studies was observed among patients with advanced left ventricular systolic dysfunction (16,19) (Table 3). Little advantage over drug therapy has been observed in patients with an ejection fraction that exceeds 35% (21).

Oseroff O, Retyk E, Bochoeyer A. Subanalyses of secondary prevention

implantable cardioverter-defibrillator trials: Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators (AVID), Canadian Implantable Defibrillator Study (CIDS), and Cardiac Arrest Study Hamburg (CASH). Curr Opin Cardiol 2004;19:26 –30.

Saludos.

Oscar Pellizzón.

Gracias Oscarsinho. Muy importante.

Nosotros hacemos alguna mención em nuestro manuscrito.

- Dubner S, Schapachnik E, **Riera AR**, Valero E. Chagas disease: state-of-the-art of diagnosis and mgement. Cardiol J. 2008; 15(6):493-504.

Andrés R. Pérez Riera

Estimado Oscar

Genial tu intervencion aclarando indicaciones de CDI en prevencion secundaria, y la relación CDI / Amiodarona.

Como estamos en un foro de alto nivel científico, me gustaría hacer una observación, y también conocer tu opinión:

1. El trabajo de referencia en este tema, no es el citado por vos de nuestro amigo Oseroff y mis queridísimos Retyk y Andy Bochoeyer, ya que este trabajo se trata de un review. El trabajo que cortó las aguas, es el Metaanalysis de Stuart Connolly, publicado en Eur Heart J en el 2000. En ese trabajo se metaanalizaron el AVID (mencionado por vos), el CIDS (Canadiense, de Connolly) y el CASH (de Hamburgo). Estos son los 3 trabajos que avalan el implante de CDI para prevención secundaria (y que refuerzan la indicación "I", nivel de evidencia "A").

En este metaanalysis, se demuestra que el CDI es superior a Amiodarona para prevenir la muerte súbita, en pacientes que ya han presentado un evento arrítmico grave.

Como bien vos señalas, se hizo un análisis en ptes con Fr Eyeccion > y < de 35%. Los beneficios del CDI se concentraron en aquellos que presentaban Fr Eyeccion < 35%.

2. Ahora bien. ¿Quiere esto decir que la Amiodarona es superior al CDI si tuviste una muerte súbita abortada pero tu Fr Eyeccion es > 35%?

Claramente NO. ¿Por qué? Porque el corte de 35% fue un análisis "POST HOC". Esto quiere decir, que no fué planteado en la hipótesis original, y testeado con estudio randomizado. Sino que se miró para atrás, se hicieron curvas ROC, y se determinó que por arriba y abajo del 35% quedaban concentrados los pacienets de mayor y peor beneficio para CDI. De ninguna manera, esto indica que si tenes antecedentes de cardiopatía isquémica, tuviste una FV, y tu Fr Eyeccion es 36%, la Amiodarona te va a proteger mejor que el CDI.

No hay que olvidarse, que en los 3 trials, CDI fue superior a Amiodarona en el análisis general. Punto. Los análisis POST HOC son generadores de hipótesis, NO reglas que hay que aplicar directo en la clínica.

Me interesa muchísimo tu opinión al respecto y tu conducta frente a: Pte 66 años, IAM Ant hace 8 meses, CF I-II, QRS angosto, Fr Eyeccion 37%. Presenta FV y es cardiovertido en el Estadio Olímpico de Chacarita en San Martin BsAs, porque el Dr Baranchuk donó un desfibrilador externo. Lesión de 3 vasos no revascularizable. Tratado en ese momento con ASA, Carvedilol, Ramipril, Atorvastatin.

¿Que haces?

1. Amiodarona
2. CDI
3. Nada

Un abrazo fuerte desde el frío

Adrián Baranchuk

Estimado Adrian,
es correcta tu observación y el metaanálisis que mencionás es justamente el que determinó que el CDI es clase I en aquellos que presentaron una TV/FV. De todas maneras, para continuar la polémica, el CDI prolongó 4 meses de vida en el seguimiento del AVID (2 años). En el trabajo original la Fey > 35% está en un hazard ratio de 0,9 (cerca del 1: sin ningún beneficio) y la Fey < 35% es de 0,6 (amplio beneficio). También vale decir que la FEy media del AVID fue de 31-32. Es decir que esa Fey está lejos del 40% que era el cut-off.

El CIDS (más pequeño que el AVID) no demostró diferencias significativas (mortalidad global 20% y mortalidad arrítmica 30% a favor del CDI vs amio, pero esta diferencia no es significativa. Circulation. 2000;101:1297-1302). Seguramente vos podrás hablar mucho de este trial ya que es canadiense.

Acuerdo con tu observación que el análisis de + o - 35% es post hoc y eso sirve para hipótesis de un trial randomizado y eso no se realizó.

En relación a tu pregunta del paciente que tuvo una FV, y te diría que en la cancha de Rosario Central o Ñuls (porque no todo pasa por Bs. As., jaja, aunque Dios y Cristina están ahí) le pongo un CDI, tuvo una MS abortada.

Ahora, ¿es lo mismo tener una TVMS que una FV en una cardiopatía isquémica, no isquémica o chagásica? Me gustaría saber qué pensás al respecto.

Me encantó el desafío. Gran abrazo de la calurosa y húmeda Rosario.

Gracias Andrés por mandarme esa referencia.

Oscar Pellizzón.

Amigos

Que ECG tan hermosos, felicitaciones por hacer el rápido screening del hermano, que pegada!

Ya se barajaron todos los diagnósticos, creo.

1. A favor de Chagas: la certera epidemiología, el trastorno de conducción del paciente (el del hermano lo encuentro menos "típico" pero como dice Oscar, también podría ser. Para sostener esta hipótesis, hay que aceptar que toda la flia tiene Chagas, y que otros ya se murieron por arritmias asociadas a Chagas.

2. A favor de ARVD: Bajo voltaje, BCRD + HBAI, T negativa de V1 a V5. No veo Epsilon. Para sostener esta hipótesis, hay que aceptar que los fliares previos la tenían, y que el hermano la tiene, tal vez con compromiso biventricular, ya que hay necrosis anterior. Tiene demasiado voltaje, pero claro, como es una enfermedad progresiva, podría ser.

3. Brugada: me parece que nadie sostiene esta posibilidad, por el claro compromiso estructural.

Si se confirma Cardiopatía Chagásica con deterioro severo de la Fr eyección, corresponde implantar un CDI (Ver Chagtop, Registro de Muratore (Europace 2009) y trabajos de A Rassi al primer paciente, en este caso por prevención secundaria (ya tuvo TV como muestra el extraño ECG 2).

Para el hermano, si se confirma lo mismo, estamos en una encrucijada, y trataría de tener más elementos de riesgo (Holter, valoración del sistema nervioso autónomo, Clase funcional, etc). Los datos para prevención primaria son mas escasos. El Registro de Muratore (de todo Latinoamérica) indica CDI también, pero es menos concluyente.

Saludos

Adrián Baranchuk

Estimado Dr Adrián Ud plantea un paciente de 66 años con IAM previo y un deterioro de la FEY, refiere una leve mejor FEY que el paciente que se discutió hace unos días. Y Ud lo incluía según mal no recuerdo dentro de los criterios del MADIT II, en el caso anterior solo tenía TV en el Holter según recuerdo. No me pregunto a mí, pero discúlpeme el atrevimiento de preguntarle yo a Ud. (es una manera de aprovechar sus conocimientos con el mayor respeto). Ud no refirió ángor ni disnea, ¿la prueba de isquemia es positiva? si es positiva, no revascularizable se podría ajustar el tratamiento médico? igualmente si se encontrara isquémico ¿le colocaría un CDI?

En el paciente de 42 años referido que fue cardiovertido, con antecedentes de muerte súbita familiar? Estuve tratando de encontrar bibliografía que solo incorporara pacientes chagásicos con o sin deterioro de la FEY con o sin arritmias a algún estudio randomizado y no encontré ninguna referencia. Si a tratamiento con amiodarona en chagásicos. Los estudios de CDI eran post IAM, miocardiopatía diltadas de diferentes causas pero ni siquiera en puntos secundarios encontré análisis del CDI en chagásicos.

Es extrapolable los estudios randomizados, metaanálisis, etc de una población totalmente diferente a este solo por muerte súbita. ¿Si es que es chagásico?

Muchas gracias desde antemano Dr Adrian

Una pregunta al que expuso el caso, los familiares ¿a qué edad tuvieron muerte súbita? ¿todos después de los 40 años?

¿Alguno menor? ¿Cuántos familiares?

Estimado Dr. Garcia Niebla, me resultó muy atractivo el sospechar displasia arritmogénica del VD. Pero al observar los ECG pensé afecta a todo el sistema de conducción, tiene BAV de primer grado. BCRD y eje desviado a la izquierda (HBAI). Muy interesante el análisis del origen de la TV en el VD.

Pero la displasia arritmogénica del VD, Si puede darle los signos del BCRD y sobrecarga del VD. Pero no afecta al sistema de conducción (BAV de 1er grado y HBAI), lo que me impresiona la descarta como causa, Chagas es la más simple estadísticamente y por los hallazgos del ECG. Estaba tratando de recordar alguna enfermedad de afectación cardíaca, eléctrica como Brugada, pero no encuentro ningún patrón sugestivo de esta patología y pensé aparte de Chagas que puede afectar al sistema eléctrico cardíaco en forma difusa y la única causa para descartar con componente familiar son las enfermedades por depósito. Que afecten por infiltración su sistema de conducción y músculo cardíaco con inestabilidad eléctrica y muerte súbita por esta causa. Amiloidosis cardíaca o alguna otra enfermedad similar? ¿sugerencias y críticas?

Igualmente por frecuencia y epidemiología lo primordial me impresiona descartar enfermedad de Chagas.

Muchas gracias y saludos.

Martin Ibarrola

No sólo es de América del Sur, sino de Minas Gerais, un estado endémico de Chagas, y el paciente y su hermano pertenecen a una clase socioeconómica baja. Me sumo al Dx de bloqueo trifascicular y por la nula progresión de R en precordiales correspondería a una miocardiopatía dilatada.

Luciano Pereira

Hola Oscar

Rosario: que ciudad increíble, descansando a la orilla del Paraná, esa agua marrón salpicada de Dorados. Se me vienen sin pensar demasiado, Fito y compañía, el Negro Olmedo y canallas y leprosos a la mente.

Las estatuas de mi tío Waxemberg desafiando la gravedad y la lógica a la orilla del río.

Cuanta buena medicina, cardiología, y ahora electrofisiología ha producido Rosario!!!

Cuna de los estudios ECLA, que tan bien nos representan en el mundo:

Pellizon, Ramos, Valentino, D'angelo, Gnoatto, Lanzotti y tantos otros más...perdón la omisión es producto de mi Alzheimer no de la falta de méritos de los que no estoy nombrando. Una verdadera cuna de talentosos.

¿Será lo que comen por ahí? ¿Tal vez una dieta mas rica en pescado de agua dulce?

Estoy de acuerdo contigo: isquémico no isquémico y Chagas son diferentes y no hay que extrapolar. También de acuerdo que TV y FV no es lo mismo, y no hay que extrapolar.

Abrazo

Adrián Baranchuk

Bueno Adrián, si alguna vez te invitamos o venís a Rosario de visita te asaré unas ricas bogas, dorados o surubíes y pasaremos por la peatonal Córdoba para que admires a las chicas más lindas de la Argentina (somos famosos también por eso).

Abrazo.

Oscar Pellizzón.

Martin

El paciente propuesto tuvo FV resucitada. NO cumple criterios MADIT II (que es un trial de prevención primaria).

Cuando el paciente NO es revascularizable, esté isquémico o no, si se ha intervenido con la mejor medicación posible, las cartas están echadas.

Ud deberá decidir: Amio, CDI o nada.

¿Ud que haría y porqué?

Adrián Baranchuk

PS: respecto a no extrapolar a Chagas, estoy de acuerdo. En un mail anterior mande la bibliografía sobre Chagas y CDI (que es muy escasa).

Hola Martin

Estoy de acuerdo en el concepto de mantener displasia solo como un diagnóstico diferencial, pero NO exactamente por las razones que Ud refiere.

El eje desviado a la izquierda es muy común de verse en la displasia, menos frecuente el PR prolongado. Pero eso NO descarta displasia en absoluto.

Por privado le puedo mandar un abstract que publicamos con mi grupo de España en seguimiento electrocardiográfico a 12 años en un grupo de pacientes con ARVD.

Saludos

Adrián Baranchuk

¡Doy Fe!

Y si te pasa como a mí, también podés tomar un café en El Cairo, sacarle una foto a la Mesa del Negro Fontanarrosa, emocionarte y ponerte a llorar

Un abrazo

Edgardo Schapachnik

Querido Oscar

Acepto gustoso el convite, no hay nada que me guste más que una buena boga asada o un surubí al limón...

Respecto a admirar las señoritas, solo tengo ojos para mi mujer.

Adrián Baranchuk

Prezado Martin

O grupo de trabalho em Miopatias do ventrículo direito da Sociedade Europeia de Cardiologia e o Conselho científico em cardiomiopatias da Sociedade e da Federação internacionais de Cardiologia incluiu diversas características de ECG nos critérios para o diagnóstico de DAVD¹:

1. Inversão da onda T de V1-V3,².
2. Duração de QRS (QRSd) em V1 com V3 ≥ 110 ms
3. Presença de uma onda do épsilon (potenciais elétricos após o fim do complexo de QRS).
4. Dispersão de QRS e do QT
5. Bloqueio parietal, definido como um QRSd nas derivações V1 a V3 que excede o QRSd na derivação V6 em pelo menos > 25 ms³.
6. Uma relação do QRSd nas derivações $\frac{V1+V2+V3}{V4+V5+V6} \geq 1.2$.⁴

The Task Force on Right Ventricular Myopathies of the European Society of Cardiology and of the Scientific Council on Cardiomyopathies of the International Society and Federation of Cardiology included several ECG features of the disease in the criteria for diagnosis of ARVD/C.¹ These criteria included

1. T-wave inversions in V₁ through V₃,
2. QRS duration (QRSd) ≥ 110 ms in V₁ through V₃, and
3. **The presence of an epsilon wave (electric potentials after the end of the QRS complex).**
4. QRS and QT dispersion,²
5. Parietal block, defined as a QRSd in leads V₁ through V₃ that exceeds the QRSd in lead V₆ by >25 ms³ and
6. A ratio of the QRSd in leads $\frac{V_1+V_2+V_3}{V_4+V_5+V_6} \geq 1.2$.⁴

References

1. McKenna WJ, Thiene G, Nava A, et al. Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy. Task Force of the Working Group on Myocardial and Pericardial Disease of the European Society of Cardiology and of the Scientific Council on

Cardiomyopathies of the International Society and Federation of Cardiology. Br Heart J.1994; 71: 215–218.

2. Turrini P, Corrado D, Basso C, et al. Dispersion of ventricular depolarization-repolarization: a noninvasive marker for risk stratification in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Circulation.2001; 103: 3075–3080.

3. Fontaine G, Fontaliran F, Hebert JL, et al. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Annu Rev Med.1999; 50: 17–35.

4. Peters S, Trummel M. Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia-cardiomyopathy: value of standard ECG revisited. Ann Noninvasive Electrocardiol.2003; 8: 238–245.

Por favor esta é uma critica respeitosa, para que melhoramos mas dispasia deve escrever com s e não com c fere a vista este erro.

Andrés R Pérez Riera.

Gracias estimado Dr. Adrian:

Le colocaria un CDI, ya que algunos estudios demostraron en este grupo de pacientes como el por Ud propuesto una reducción del 40% de MS que se mantenía en el 30% a los 2 y 3 años.

El estudio AVID ha sido el primer estudio prospectivo, aleatorio y controlado que ha demostrado que el DAI, comparado con el tratamiento antiarrítmico, mejora la supervivencia global en pacientes con arritmias ventriculares malignas. Con FEVI < 40% (como su paciente). los estudios CIDS y CASH avalan mejor sobreviva con CDI vs amiodarona.

En el otro paciente de 42 años encontré una revisión muy interesante del Dr Oscar, que leyéndola es bastante clara a qué conducta seguir con el paciente de 42 años.

Muerte súbita en la miocarditis chagásica crónica: tratamiento - **Dr. Oscar A. Pellizzón**

Y gracias DR Perez Riera por la aclaracion, Leere el task force.

Y Dr. Adrian si me puede enviar el paper por ud citado le estaría muy agradecido.


Saludos a todos

Martin Ibarrola

Queridos amigos les envío nuestro parecer junto a consideraciones teóricas del caso de MS familiar


Andrés R. Pérez Riera


P axis: 0°
P duration: 100ms
P voltage: 1mm









P duration: 100ms

PROLONGED PR INTERVAL





PRECORDIAL LEAD FEATURES



- Pointed first component of P wave in V1: Only suggestive Right Atrial Enlargement (RAE)? Has not the criteria P wave height >1.5mm in led V2
- First degree AV block: PR interval > 220ms
- Low QRS voltage: < 10mm of QRS complexes across all precordial leads
- Trifasic pattern with wide final R' in V1, QRS duration >120ms and broad final S wave in left leads: Complete RBBB
- Transitional zone (R=S) dislocated to left: V6. CW rotation on longitudinal axis: RVH
- Inverted T wave across precordial leads: non-specific repolarizations disturbance.

Rhythm: Sinus; **HR:** 57bpm; **P wave:** S[∧]P +0°; P duration 100ms: P voltage: 1mm. **PR interval:** 230ms. Minimal prolongation of PR interval. QRS: QRS axis: near - 90° isodyphasic in I and positive in aVR and aVL; QRS duration:130ms; **QRS voltage:** low voltage in both FP and HP; **Transition zone on precordial leads:** dislocated to left CW rotation suggestive of RV Enlargement rS pattern in inferior leads, qR in aVL and I, extreme QRS axis deviation: LSFb..

Tryphasic QRS pattern rsR' in V1 with broad final R' wave and QRSd>120ms; CRBBB .


Possible trifascicular block: first degree AV block, CRBBB, and LAFB. It is diagnosed on an ECG and has three features: prolongation of the PR interval (first degree AV block) RBBB either LAFB or LPFB. Trifascicular block is important to diagnose because it is difficult to tell based on the surface ECG whether the prolonged PR interval is due to disease in the AV node or due to diffuse distal conduction system disease. In the former case, if the block at the AV node level becomes complete, the escape rhythm will originate from the bundle of His, which typically will generate heart rates in the 40s, allowing the individual to survive and complain of symptoms of fatigue or near-syncope to their physician. In the latter case, however, because the conduction system disease is diffuse in nature, the escape rhythm may be fascicular or ventricular, which may be at rates that are life-threateningly low. Trifascicular block is important to diagnose because it is difficult to tell based on the surface ECG whether the prolonged PR interval is due to disease in the AV node or due to diffuse distal conduction system disease. In the former case, if the block at the AV node level becomes complete, the escape rhythm will originate from the bundle of His, which typically will generate heart rates in the 40s, allowing the individual to survive and complain of symptoms of fatigue or near-syncope to their physician. In the latter case, however, because the conduction system disease is diffuse in nature, the escape rhythm may be fascicular or ventricular, which may be at rates that are life-threateningly low.

ECG DIAGNOSIS EXTERNAL ECG

- 1) Non-Sustained Monomorphic VT (NS-VT) detected only in I and II.



- 2) Atrial fibrillation



- 3) Very low diffuse QRS voltage in both FP and HP: $<5\text{mm}$ in FP and $<10\text{mm}$ in HP


- 4) Polymorphic Premature Ventricular Contractions (PVCs) Multifocal premature ventricular contractions arise when more than one site in the ventricles cause depolarization meaning each peak on the ECG will have a different shape



- 5) Couplet PVCs. Occur in pairs.



This ECG belong to an asymptomatic younger brother who was accompanying our patient (29 years old). We performed this ECG only by curiosity.



Sinus rhythm, suggestive of right atrial or biatrial enlargement, low QRS voltage only in frontal leads, electrically inactive anterolateral wall (pseudomyocardial infarction?), decrescent initial r voltage from V₂ to V₅, inferolateral repolarization changes.

FINAL DIAGNOSIS

Chronic Chagasic Dilated Cardiomyopathy mixed form:

- Arrhythmogenic: Polymorphic Ventricular Contractions (PVCs), Couplets pairs, and NS-VT
- Dormotropic: with ventricular conduction abnormalities: first degree AV block Complete Right Bundle Branch Block(CRBBB) and Left Anterior Fascicular Block (LAFB)
- With severe ventricular systolic dysfunction, dilated chambers secondary to extensive fibrosis (biventricular and biatrial enlargement) and significative decrease of ejection fraction. Complement fixation test Guerreiro Machado reaction + in both
- Chagas risk index between 12-20 point: 85% risk of death in 10 years.

| Risk factor | Point |
|---|----------------------------------|
| NYHA class iii or IV | 5 |
| Cardiomegaly \geq +++ chest X-ray | 5 |
| Non-Sustained Ventricular Tachycardia (NS-VT) | 3 |
| Low voltage on ECG | 3 |
| Male gender | 2 |
| Total points | Risk of death in 10 years |
| 0 a 6 | 10% |
| 7-11 | 40% |
| 12-20 | 85% |

1. Rassi A Jr, et al. Development and validation of a risk score for predicting death in Chagas heart disease. New Engalnd J of Medicine 2006; 355: 700-808.

CHRONIC CHAGASIC CARDIOMYOPATHY

Concept: chronic, fibrosis, necrotic, vasculopathic, immunopathic, disautonomic, accumulative, progressive and diffuse myocarditis. In most cases, the coexistence of areas of myocytic degeneration, inflammatory infiltration, and fibrosis suggests a permanent evolving process:

Fibrosis: reparative and reactive interstitial.

Necrosis: by necrotizing microvascular arteritis that leads to platelet thrombosis and subsequent hypoperfusion and foci of myocytolytic necrosis, which progressively destroy both myocytic contractile cells (myocytolysis) and the cardiac conduction system.

Immunopathic: crossed autoimmune reaction, triggered against the antigen MXT of *Trypanosoma Cruzi*, homologous to myosin of cardiac structures. Cyclophosphamide used in heart transplantation facilitates the development of autoimmune disease because of a selective depletion of suppressor T cells¹ by promoting parasympathetic disturbances that appear as consequence of alterations on the muscarinic receptor distribution at different neural integration levels. Infestation causes inflammatory lesions and immune responses, particularly mediated by CD4+, CD8+, interleukin-2 (IL) and IL-4, with cell and neuron destruction and fibrosis, and leads to blockage of the cardiac conduction system, arrhythmia, cardiac insufficiency, aperistalsis, and dilatation of hollow viscera, particularly the esophagus and colon².

Neurogenic Theory: Autonomic denervation: of focal character, irregular distribution, variable and unpredictable. The neurogenic theory explains cardiomyopathy as a result of post-ganglionic parasympathetic denervation.

1. Labrador-Hernández M, Suárez-Graterol O, Romero-Contreras U, The cholinergic system in cyclophosphamide-induced Chagas dilated cardiomyopathy in *Trypanosoma-cruzi*-infected rats: an electrocardiographic study. *Invest Clin.* 2008 Jun;49:207-224.
2. Coura JR. Chagas disease: what is known and what is needed--a background article. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2007 Oct 30;102 Suppl 1:113-122.

Chagas disease denominations and transmission

Others denominations: Portuguese: *doença de Chagas*, Spanish: *enfermedad de Chagas-Mazza*, *mal de Chagas* in both languages; also called **American trypanosomiasis**

Concept and transmission way:

is a tropical parasitic disease caused by the flagellate protozoan *Trypanosoma cruzi*. *T. cruzi* is commonly transmitted to humans and other mammals by an insect vector, the blood-sucking assassin bugs of the subfamily Triatominae (family Reduviidae) most commonly species belonging to the *Triatoma*, *Rhodnius*, and *Panstrongylus* genera.

The disease may also be spread through blood transfusion¹ and organ donation/transplantation, ingestion of food contaminated with parasites, and from a mother to her fetus(vertical transmission).

1. Wendel S. TRANSFUSION TRANSMITTED CHAGAS DISEASE: IS IT REALLY UNDER CONTROL? Acta Trop. 2009 Dec 29. [Epub ahead of print]
2. Dauby N, Alonso-Vega C, Suarez E, Flores A, et al. Maternal infection with *Trypanosoma cruzi* and congenital Chagas disease induce a trend to a type 1 polarization of infant immune responses to vaccines. PLoS Negl Trop Dis. 2009 Dec 22;3(12):e571.

EPIDEMIOLOGIC ASPECTS

Endemic in Latin America from the north of Mexico to the South of Argentina and Chile. It is estimated that 15 to 16 million people are infected with *Trypanosoma cruzi* in Latin America and 75 to 90 million people are exposed to infection¹.

120,000 new cases diagnosed in Latin America. The Pan American Health Organization (PAHO) estimates that currently 7.7 million of people have *Trypanosoma cruzi* infection in the 21 endemic countries from the southern and southwestern United States to central Argentina and Chile².

Most of patients do not know they are infected

17 thousand deaths/year in Brazil, from which 5 thousand by heart disease

≈ 3 millions of Chagasic patients in Brazil, from whom 1 million with heart failure

≈60% of patients display the indeterminate form and only 10% severe heart disease

In Sao Paulo Capital City, it is estimated in 300,000 infected patients. In the state of Sao Paulo there are 500

Large-scale population movements (globalization) from rural to urban areas of Latin America and to other regions around the world have increased its geographic distribution³.

Mortality is around 45.000 to 50.000 people/year and the main cause is cardiac cardiomyopathy: 60% sudden cardiac death: causes: Ventricular fibrillation, bradyarrhythmias, thromboembolism, rarely aneurysmal rupture and 30% congestive heart failure.

1. Coura JR. Chagas disease: what is known and what is needed--a background article. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2007 Oct 30;102 Suppl 1:113-122.
2. Sánchez-Sancho F, Campillo NE, Páez JA. Chagas Disease: Progress and New Perspectives. *Curr Med Chem.* 2009 Dec 17. [Epub ahead of print]
3. Carod-Artal FJ. *Neurologia.* Globalization, stroke and Chagas disease on the hundredth anniversary of its discovery 2009 Jul-Aug; 24: 431-432.

Different prevalence rates in Latin American Countries

| Country | Infection prevalence rates |
|--|----------------------------|
| Bolivia | 20% of population |
| Argentina, Paraguay, Honduras, El Salvador | 5-10% |
| Chile, Colombia, Equator, Uruguay | 1-5% |
| Brazil | 1.3% |
| Mexico | <1% |
| Nicaragua | <1% |

With the intense human migratory movement from developing to developed countries, it became more common and evident. Because of population migration from endemic areas and newly instituted blood bank screening, US clinicians are likely to see an increasing number of patients with suspected or confirmed. Chagas disease presents an increasing challenge for clinicians in the United States. Despite gaps in the evidence base, current knowledge is sufficient to make practical recommendations to guide appropriate evaluation, management, and etiologic treatment¹.

1. Bern C, Montgomery SP, Herwaldt BL, et al. Evaluation and treatment of chagas disease in the United States: a systematic review. JAMA. 2007 Nov 14; 298: 2171-2181.

Economic hardship and/or political turmoil stimulated migration of *Trypanosoma cruzi*-infected population from Latin American countries to the United States and Europe; originating cases of Chagas disease transmitted through blood, organ donation, and vertical transmission.

Hispanic immigrant women of reproductive age in the United States coming from Chagas disease-endemic countries accounted for 2,384,644, and 5,841,538 in 1990 and 2000, respectively. Considering the prevalence rates for *T. cruzi* infection in their country of origin and the risk of newborns from infected mothers to acquire congenital infection as 1.33% and 5%, is estimated that the number of *T. cruzi*-infected newborns was 85-318 in 1990 and 166-638 in 2000. Diagnosis of infection in the mother and newborns at risk is needed. A high rate of cure is achieved, almost 100%, when the offspring is treated early. Health authorities, professional associations, physicians, and Hispanic groups should pay more attention to the subject¹.

Switzerland

Several cases have been diagnosed in Switzerland, where systematic screening of groups at risk should be implemented. As the vast majority of persons at risk belong to marginalized communities with limited access to health care, systematic screening and treatment of infected individuals represent a major challenge in order to interrupt the congenital transmission and improve the long term prognosis².

1. Yadon ZE, Schmunis GA. Congenital Chagas disease: estimating the potential risk in the United States. *Am J Trop Med Hyg.* 2009 Dec;81:927-933. .
2. Jackson Y et al. Chagas disease in Switzerland: Managing an emerging infection and interrupting its transmission. 2008;4: 1212-1214., 1216-117.

The chronic nature of Chagas', coupled with increasing numbers of immigrants from T. cruzi-endemic countries, suggests that Chagas' is a long-term public health problem.

Leiby et al ¹ reported on a multiyear epidemiologic study of T. cruzi in Los Angeles and Miami blood donors. From May 1994 to September 1998, blood donors in Los Angeles and Miami were queried regarding birth or time spent in an endemic country. Donations of "yes" respondents were tested by EIA, confirmed by radioimmunoprecipitation assay, and if confirmed as seropositive, enrolled in look-back investigations. A total of 1,104,030 Los Angeles and 181,139 Miami donors were queried regarding risk; 7.3 and 14.3%, respectively, responded yes. Seropositive rates were 1 in 7,500 Los Angeles and 1 in 9,000 Miami donors. In Los Angeles, seroprevalence rates increased significantly from 1996 to 1998 and were significantly higher for directed donors than nondirected donors. Look back identified 18 recipients, all of whom were seronegative for T. cruzi. Significant numbers of T. cruzi-seropositive donors contribute to the U.S. blood supply. The incidence of seropositivity is enhanced by minority recruitment efforts necessitated by donor demographic shifts. Similarly, high rates among directed donations in Los Angeles are attributable to a disproportionate number of at-risk directed donors. Current look-back data likely underestimate the frequency of transfusion-transmitted T. cruzi. These results indicate that continued evaluation of transfusion as a mode of T. cruzi transmission in the United States is needed.

1. Leiby DA, Herron RM Jr, Read EJ, et al. Trypanosoma cruzi in Los Angeles and Miami blood donors: impact of evolving donor demographics on seroprevalence and implications for transfusion transmission. *Transfusion*. 2002 May;42:549-555.

Data on the prevalence and distribution of Chagas disease improved in quality during the 1980s as a result of the demographically representative cross-sectional studies in countries where accurate information was not previously available.

A group of experts met in Brasilia in 1979 and devised standard protocols to carry out countrywide prevalence studies on human *T. cruzi* infection and triatomine house infestation.

Thanks to a coordinated multi-country programme in the Southern Cone countries, the transmission of Chagas disease by vectors and via blood transfusion was interrupted in Uruguay in 1997, in Chile in 1999 and in Brazil in 2006; thus, the incidence of new infections by *T. cruzi* across the South American continent has decreased by 70%.

Similar multi-country initiatives have been launched in the Andean countries and in Central America and rapid progress has been reported towards the goal of interrupting the transmission of Chagas disease, as requested by a 1998 Resolution of the World Health Assembly.

The cost-benefit analysis of investment in the vector control programme in Brazil indicates that there are savings of US\$17 in medical care and disabilities for each dollar spent on prevention, showing that the programme is a health investment with very high return.

Many well-known research institutions in Latin America were key elements of a worldwide network of laboratories that carried out basic and applied research supporting the planning and evaluation of national Chagas disease control programmes¹.

1. Moncayo A, Silveira AC. Current epidemiological trends for Chagas disease in Latin America and future challenges in epidemiology, surveillance and health policy. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2009 Jul;104 Suppl 1:17-30.

Population movements from Chagas disease-endemic areas to non-endemic countries due to immigration make the occurrence of this disease in these latter areas possible. Rodríguez-Guardado et al¹ describe the results of a screening program conducted in an immigrant population from endemic areas, attending the Tropical Medicine Unit of the Hospital Central de Asturias between June 2006 and June 2008.

The ID-Chagas antibody test (particle gel immunoassay (PaGIA); DiaMed-ID) was used as a screening assay.

The authors analyzed 64 patients, 9 of whom (14%) tested positive for Chagas disease antibodies, a diagnosis that was confirmed in all cases.

Six patients came from Bolivia, 2 from Paraguay and 1 from Brazil. Chagas disease is of increasing importance, even in areas with low migratory flows; hence screening programmes for this population group are especially important.

The Catalanian Blood Bank has implemented a screening program for Chagas disease in at-risk blood donors and has performed a study to determine the seroprevalence of *Trypanosoma cruzi* infection in the donor population. Overall seroprevalence was 0.6%, with 11 donors confirmed positive among the 1770 at-risk donors studied; the highest rate (10.2%) was in Bolivian donors. Interestingly, 1 of the 11 positive donors was a Spaniard who had resided various years in a Chagas disease endemic area. Furthermore, 1 of the positive donors presented detectable parasitemia. The results emphasize the need for *T. cruzi* screening in at-risk blood donors in nonendemic countries. If *T. cruzi* screening is not routinely performed in all donations, it remains highly dependent on proper identification of at-risk donors during the predonation interview².

1. Rodríguez-Guardado A, Rodríguez M, Alonso P, et al. Serological screening of Chagas disease in an immigrant population in Asturias, Spain proceeding from Chagas-endemic areas. *Scand J Infect Dis.* 2009;41:774-776.
2. Piron M, Vergés M, Muñoz J, et al. Seroprevalence of *Trypanosoma cruzi* infection in at-risk blood donors in Catalonia (Spain). *Transfusion.* 2008 Sep;48:1862-1868.

CARDIAC FORMS

1) Indeterminate*

2) Arrhythmogenic:

- Predominantly Dromotropic: those with ventricular conduction abnormalities
- Predominantly Polimorphic PVCs: those with rhythm disturbances
- With rhythm disturbances plus ventricular conduction abnormalities

3) With Ventricular Dysfunction: Chronic Dilated Chagasic Cardiomyopathy

4) Thromboembolic

5) Mixed

Chagasic patients, in very late stage of the disease, have a very variable degree of ventricular systolic dysfunction. Furthermore, distinct tendency for the left ventricular volumes to increase, and for the ejection fraction to decrease; when the electrocardiogram becomes progressively more abnormal, and "mixed" ECG abnormalities appear¹.

1. Casado J, Davila DF, Donis JH, et al. Electrocardiographic abnormalities and left ventricular systolic function in Chagas' heart disease. *Int J Cardiol.* 1990 Apr;27:55-62.

Indeterminate Forms

The majority of patients with Chagas' disease remain for 10 to 30 years in the indeterminate form. They have no symptoms, serologic positivity, normal ECG, normal chest X-rays, normal left ventricular global and segmental systolic function on 2-dimensional echocardiography and absence of clinical manifestations of cardiac or digestive involvement. When submitted to advanced cardiovascular tests, these patients may present significant abnormalities^{1; 2}. However, the indeterminate form concept was reaffirmed as valid, since diagnostic criteria are simple and prognosis is benignant. In clinical practice, diagnostic difficulties are frequent, related to subjectivity and uncertain meaning of clinical, ECG and radiological findings. Clomipramine(5 mg/kg/day for one month) used in the chronic indeterminate phase of the T. cruzi infection modified the natural evolution of the chagasic cardiopathy³.

1. Pazin-Filho A, Romano MM, Gomes Furtado R, Left ventricular global performance and diastolic function in indeterminate and cardiac forms of Chagas' disease. *J Am Soc Echocardiogr.* 2007 Dec;20:1338-1343.
2. Dubner S, Schapachnik E, Riera AR, Valero E. Chagas disease: state-of-the-art of diagnosis and management. *Cardiol J.* 2008;15:493-504.
3. Bazán PC, Lo Presti MS, Rivarola HW, Chemotherapy of chronic indeterminate Chagas disease: a novel approach to treatment. *Parasitol Res.* 2008 Aug;103:663-669.

THE ECG VALUE IN CHRONIC CHAGASIC CARDIOMYOPATHY

ECG is the method of choice in longitudinal population studies in endemic areas because it is simple, with a low cost and a good sensitivity.

The ECG manifestations has prognostic value.

ECG abnormalities are found to be prevalent in children and pre-adolescents where the infection prevalence is extremely high (Cochabamba's poor urban area Bolivia) indicating that under continuous exposure to infection and re-infection, a severe form of the disease may develop early in life¹.

Arrhythmias and left ventricular dysfunction are more prevalent in asymptomatic patients with chronic Chagas disease and abnormal ambulatory ECG than in patients with normal ECG.

Rhythm: sinus node dysfunction: persistent sinus bradycardia, SA block in different degrees, sinus arrest and inappropriate chronotropic response in stress test.

The corrected recovery time of the SA node and SA conduction time are altered (18% to 30% of cases.). The chronic Chagas disease patients with SA node dysfunction have higher prevalence of muscarinic agonist IgG antibodies, independent of the presence of myocardial dysfunction².

1. Medrano-Mercado N, Ugarte-Fernandez R, Butrón V, et al. Urban transmission of Chagas disease in Cochabamba, Bolivia. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2008 Aug;103:423-30.
2. Altschüller MB, Pedrosa RC, Pereira Bde B, et al. Chronic Chagas disease patients with sinus node dysfunction: is the presence of IgG antibodies with muscarinic agonist action independent of left ventricular dysfunction? *Rev Soc Bras Med Trop.* 2007 Nov-Dec;40:665-671.

Atrial fibrillation (AF) affects subjects with Chagas' disease and is an indicator of poor prognosis. In univariate analysis, left atrial diameter ≥ 3.2 cm, pulmonary arterial hypertension, frequent premature supraventricular contractions (PSPC) and ventricular contraction (PVC) counts/24 h, ventricular couplets/24 h and ventricular tachycardia (VT) are long-term predictors of AF.

P-wave signal-averaged ECG revealed a limited long-term predictive value for AF.

In chronic Chagas' disease are long-term predictors of AF the following factors¹:

1. Large left atrial diameter
2. Pulmonary arterial hypertension
3. Frequent Supraventricular Premature Contractions
4. PVCs
5. VT.

The rate of left ventricular mass enlargement and systolic function deterioration impact AF incidence in this population.

Sick sinus syndrome, atrial extrasystoles, intraatrial conduction disturbances, and AF or flutter are common findings in different stages of the disease².

1. Benchimol-Barbosa PR, Barbosa-Filho J. Mechanical cardiac remodeling and new-onset atrial fibrillation in long-term follow-up of subjects with chronic Chagas' disease. *Braz J Med Biol Res.* 2009 Mar;42:251-262.
2. Elizari MV, Chiale PA. Cardiac arrhythmias in Chagas' heart disease. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 1993 Oct;4:596-608.

Dromotropic alterations in the AV node and intraventricular conduction system:

Further compromise of the conduction system can lead to different degrees of AV block. Chagas' disease is the main cause of bundle branch block and AV block in endemic areas. type II first or second degree blocks (14.3%) trifascicular block and even total AV block: (2.5%).

Post-His: the most frequent ones are first degree AV blocks, with broad QRS, which in 50% of cases are located in the AV node and the rest in the His-Purkinje system or in both.

Right bundle branch block alone or in combination with Left Anterior Fascicular Block (LAFB) are the most common conduction defects. Negative T wave and Polymorphic Premature Ventricular Contractions (PVCs) are typical (25%) features. In advanced cases of Chagas' heart disease, ventricular premature contractions are extremely frequent, multiform, and repetitive (couplets and runs of ventricular tachycardia), and show R on T phenomenon.

Trifascicular block, which consists of impaired conduction in the three main fascicles of the ventricular conduction system, may progress to high-grade or complete AV block. Exceptionally, it is possible to register in the same patient paroxysmal alternating atrioventricular block and bilateral bundle branch block¹.

S-VT or Non-Sustained Ventricular Tachycardia (NS-VT): the most frequent location of VT focus are inferoposterior and lateral regions, followed by septal and apical regions, and their main mechanism is reentry, involving fibrotic and/or aneurysmatic areas.

Arrhythmias are aggravated by increased sympathetic tone, implying an enhanced risk of cardiac sudden cardiac death(SCD), which is sometimes the first manifestation of the illness. Chronic chagasic myocarditis is the leading cause of cardiovascular death, mostly as a consequence of heart failure and SCD, in endemic regions.

1. Femenia F, Cuesta A, Mauricio A. A rare form of trifascicular block with intermittent complete atrioventricular block in a patient with Chagas disease. *Cardiol J.* 2009;16:582-584.

Electrically inactive areas Electrically inactive myocardium (pseudomyocardial infarction) typically is located in subendocardial anterolateral regions of the left ventricle, areas and extensive subepicardial injury. Injured zones corresponded to location of the inflammatory foci at necropsy¹.

Other ECG features

Inferolateral repolarization changes ($\approx 28\%$)

Left ventricular overload ($\approx 24\%$ ²).

1. Aranda Fraustro A, Chávez Rentería B, Ballinas Verdugo MA, et al. Electro-histological comparison in a case of Chagasic chronic cardiomyopathy. *Arch Cardiol Mex.* 2007 Jul-Sep;77:249-252.
2. Marques DS, Canesin MF, Barutta Júnior F, et al. Evaluation of asymptomatic patients with chronic Chagas disease through ambulatory electrocardiogram, echocardiogram and B-Type natriuretic peptide analyses. *Arq Bras Cardiol.* 2006 Sep;87:336-343.

ELECTROCARDIOGRAPHIC PREDICTORS OF ADVERSE PROGNOSTIC IN CHRONIC CHAGASIC CARDIOMYOPATHY

- 1) Atrial fibrillation¹ or flutter
- 2) CLBBB (rare) in 91.3% of the cases and decreased ejection fraction(EF)
- 3) Total AV block
- 4) Anterior and inferior electrically inactive area
- 5) Polymorphic premature ventricular contractions or in salvos
- 6) Frequent supraventricular and ventricular premature beats, and VT¹
- 7) NS-VT on 24-hour Holter monitoring²
- 7) Presence of NS-VT associated to decreased LVEF: 80% of mortality in 13 years of follow up. When the EF is normal, the prognosis is good
- 8) Presence of S-VT: 100% of mortality in five years.
- 9) The ECG abnormalities that correlated independently with depressed EF are: PVCs, VT, LBBB, AF, complete AV block, and anterior and inferior electrically inactive areas (fibrosis³.)
- 10) Prolonged filtered QRS duration obtained by SAEKG is an independent predictor of death. A prediction score including three risk factors, depressed LVEF, VT and prolonged filtered QRS complex, has shown to be useful for stratifying risk⁴.

1. Benchimol-Barbosa PR, Barbosa-Filho J. Mechanical cardiac remodeling and new-onset atrial fibrillation in long-term follow-up of subjects with chronic Chagas' disease. *Braz J Med Biol Res.* 2009 Mar;42:251-62.
2. Rassi A Jr, Rassi A, Rassi SG. Predictors of mortality in chronic Chagas disease: a systematic review of observational studies. *Circulation.* 2007 Mar 6;115:1101-1108.
3. Garzon SA, Lorga AM, Nicolau JC. Electrocardiography in Chagas' heart disease. *Sao Paulo Med J.* 1995 Mar-Apr;113:802-8013.
4. Ribeiro AL, Cavalvanti PS, Lombardi F, et al. Prognostic value of signal-averaged electrocardiogram in Chagas disease. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 2008 May;19:502-509.

Management alternatives

- 1) Etiological approach: antiprotozoal
- 2) Hygienic-dietetic approach
- 3) Medical treatment of chronic Chagas Heart failure
- 4) Anticoagulant
- 5) Pharmacological treatment of ventricular arrhythmias with class II drugs
- 6) Permanent pacemaker implantation: sinus node dysfunction, second and third degree AV block, AF with AV block or trifascicular block. Chagas disease patients with permanent pacemaker are younger, have lower ejection fraction, and worse prognosis.
- 7) Implantable Cardioverter Desfibrillator (ICD)
- 8) Radiofrequency Ablation: mainly S-VT left ventricular scars. Nonsurgical epicardial transthoracic approach
- 9) Orthoptic heart Transplantation